

КУКУРУДЗА
Рекомендації по впровадженню технології вирощування з використанням добрив **Crofter®**
(кукурудза та ін.)



| Період обробітку | Призначення внесення | Препарат | Норма витрати, л/га | Вартість за 1 л, грн. з ПДВ | Вартість на 1 га, грн. з ПДВ |
|------------------------------|---|---------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Передпосівна обробка насіння | Забезпечує рослину доступними елементами живлення, починаючи від найбільш ранніх фаз росту та розвитку. | Крофтер Насіння | 2 | 382,50 | 765,00 |
| Фаза 3-5 листка | Зниження залежності від зовнішніх факторів, прискорює інтенсивний розвиток кореневої системи, стимулює закладку генеративних органів формуючих майбутній врожай. | Крофтер Супер Старт | 1,5 | 297,50 | 446,25 |
| | | Крофтер Аміно | 0,5 | 361,25 | 180,63 |
| | | Крофтер Ретейнер | 0,1 | 212,50 | 21,25 |
| Фаза 6-9 листків | Стимулює інтенсивний розвиток вегетативної маси рослин, підвищує жаростійкість, захищає від високих температур, гарантує зав'язування качана, впливає на інтенсивність живлення через кореневу систему. | Крофтер Мікро | 1 | 182,75 | 182,75 |
| | | Крофтер Цинк | 1 | 212,50 | 212,50 |
| | | Крофтер Аміно | 0,5 | 361,25 | 180,625 |
| | | Крофтер Ретейнер | 0,1 | 212,50 | 21,25 |
| | | | Разом: | на 1 га | 2010,25 |
| | | | Площа га: | 1 | 2010,25 |
| | | | Знижка | 1,00% | 20,10 |
| | | | Разом зі знижкою, грн | | 1990,15 |

У початковий період розвитку, до утворення першого надземного стеблового вузла, кукурудза росте досить повільно, поглинання поживних речовин слабкою кореневою системою незначне, і дуже важливу роль відіграє забезпеченість елементами живлення що містяться у насінні. Тому особливо важливо для гарного старту провести передпосівну обробку насіння сумішами мікроелементів. Наступний дуже важливий період розвитку кукурудзи – фаза 3-5 листків. Незбалансованість живлення в цей період майже неможливо компенсувати в наступній фазі, оскільки саме в цей період формуються генеративні органи, що визначають майбутню врожайність. Наступна критична фаза – 6-9 листків, саме в цей період здійснення підживлення поліпшує озерненість початків кукурудзи. У процесі вегетації кукурудза поглинає значну кількість мікроелементів. Кукурудза є рослиною-індикатором цинку, вона більше за інші культури реагує на його настану у ґрунті. Крім мікроелементів, кукурудза в умовах теплового, водного і гербіцидного стресів вимагає додаткового внесення функціональних добрив і біологічно активних речовин.

ГАРАНТУЄМО МОЖЛИВЕ!

Шило Сергій
098-022-20-11, 066-022-20-11
shybas.com@gmail.com
www.crofter.com.ua