

CROFTER АМІНО БОР

Борне добриво з L-α амінокислотами



ТАРНА ОДИНИЦЯ:



20л



5л



1л

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ПЕРЕВАГИ:

- ◆ Бор у формі боретаноламіна легко засвоюється клітинами рослин.
- ◆ Вільні L-α амінокислоти та азот активізують фізіологічні процеси в рослинах, це значно підвищує ефективність добрива.
- ◆ Повністю розчинна формуляція продукту унеможливіє утворення осаду і не забиває форсунки обприскувача
- ◆ Спеціально розроблена композиція добрива сприяє ряду фізіологічних процесів, збільшується концентрація клітинного соку.
- ◆ Сприяє швидкому розвитку точок росту та посиленню утворення генеративних органів та формування товарної частини врожаю.
- ◆ Прискорюється проростання пилових трубок тим самим відбувається краще запліднення квіток.
- ◆ Відбувається формування більшої кількості квіток та збільшується їх фертильність.
- ◆ Особливо зростає стійкість до кореневих та плодових гнилей.
- ◆ Покращується еластичність клітинних стінок тим самим покращується ріст, розвиток рослин та збільшується урожайність.
- ◆ Використовується для живлення рослин, особливо чутливих до дефіциту бору, таких як: цукрові буряки, ріпак, соя, соняшник, фруктові дерева, овочі, картопля, виноград.

CROFTER АМІНО БОР

Рідке концентроване добриво для позакореневого підживлення з умістом Бору, вільних L-α амінокислот та азоту. Призначене для профілактики й швидкого усунення дефіциту бору сільськогосподарських рослин. Амінокислоти у складі продукту покращують поглинання бору листовою поверхнею, стимулюють метаболізм та підвищують стресостійкість рослин, що особливо важливо в критичну фазу генеративного розвитку.

СКЛАД

Азот (N)	Бор (B)	Амінокислоти	Густина	pH
50 г/л	150 г/л	5 г/л	1,4 г/см ³	7,5

НОРМИ ВИТРАТ

Культура	Фаза розвитку	Норма витрат
Ріпак (озимий, ярий)	2 підживлення (середня потреба) 2 підживлення (велика потреба)	0,5–1 л/га 1–1,5 л/га
Соняшник	1-2 підживлення (середня потреба) 2 підживлення (велика потреба)	0,5–1 л/га 1–1,5 л/га
Буряки цукрові (кормові, столові)	2 підживлення (середня потреба) 2-3 підживлення (велика потреба)	1 л/га 1,5 л/га
Кукурудза	1-2 підживлення (середня потреба) 2 підживлення (велика потреба)	0,5–1 л/га 1–1,5 л/га
Соя	1 підживлення (середня потреба) 2 підживлення (велика потреба)	0,5–1 л/га 0,5–1 л/га
Картопля	1-2 підживлення (середня потреба) 2 підживлення (велика потреба)	1 л/га 1,5 л/га
Овочі (відкритого і закритого ґрунту)	2 підживлення (середня потреба) 2-3 підживлення (велика потреба)	1 л/га 1,5 л/га
Зерняткові, кісточкові фрукти	1 – у фазі зеленого бутону 2 – у фазі опадання пелюсток 3 – після збору врожаю	0,5–2 л/га
Полуниця, малина	Перед цвітінням	0,5–1 л/га

Не перевищувати рекомендовані норми. Застосування шляхом дробного внесення – за даними багаторічних випробувань – показує кращі результати.

Технологія застосування:

В умовах дефіциту бору, зокрема за результатами візуальної чи лабораторної діагностики, для всіх культур (особливо для плодовоягідних та овочевих) рекомендується виконувати повторні обробки з інтервалом 7–10 днів. Для досягнення кращих результатів рекомендуємо виконувати підживлення в комплексі з іншими препаратами (згідно технологічних схем для відповідної культури). Дивіться рекомендовані схеми застосування добрив «Crofter».